


ATROFIA CEREBRAL FRONTAL (DEMENCIA FRONTOTEMPORAL)

La demencia frontotemporal, a veces llamada demencia del lóbulo frontal, describe un grupo de enfermedades caracterizadas por una degeneración de las células nerviosas, sobre todo aquellas que se encuentran en los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Al contrario de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal usualmente no incluye la formación de placas amiloides. En muchas personas con demencia frontotemporal está presente una forma anormal de la proteína *tau* en el cerebro, la que se acumula formando enredos neurofibrilares. Esto interrumpe las actividades normales de la célula y puede hacer que las células se mueran.

Los expertos creen que la demencia frontotemporal es la causa de entre 2-10% de todos los casos de demencia. Los síntomas de demencia frontotemporal generalmente aparecen entre las edades de 40 y 65 años. En muchas instancias, las personas que tienen demencia frontotemporal tienen un historial familiar de demencia, lo que sugiere que un fuerte factor genético contribuye a la enfermedad.

La duración de la demencia frontotemporal varía. Algunos pacientes se deterioran rápidamente en un período de dos a tres años, mientras que otros muestran cambios mínimos durante muchos años. Las personas con demencia frontotemporal viven un promedio de entre 5 a 10 años tras el diagnóstico.



Síntomas

Algunos de los principales síntomas de la demencia frontotemporal son los siguientes:

Anomalías físicas: El paciente presenta menor control sobre su cuerpo y sufre de incontinencia urinaria. Existe también cierta tensión muscular por todo el organismo.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

El profesional de la salud que está tratando al paciente será el que determine la estrategia terapéutica a seguir.

Problemas neurológicos: El paciente presenta una afectación de las funciones nerviosas que pueden resultar en la pérdida de la memoria y la apraxia. También puede haber dificultades para entender el lenguaje y hablar correctamente.

Trastornos emocionales: Un síntoma inicial de la demencia frontotemporal es un cambio en la presentación emocional del paciente. La persona sufre cambios de humor repentinos y no muestra simpatía o calidez emocional. Hay una pérdida de interés en actividades diarias y eventos que afectan a la profesión de las personas. En tales casos, una persona a menudo no puede mantener su empleo.

Alteraciones del comportamiento: Un individuo que padece este trastorno también muestra un cambio notable en el comportamiento. Su comportamiento en el ámbito social se vuelve muy diferente.

Etapas

Un paciente de demencia frontotemporal pasa a través de siete etapas.

Primera Etapa

La persona no muestra un comportamiento anormal. No hay pérdida de memoria y la salud mental de la persona está intacta. Todas las personas normales se consideran potenciales pacientes de demencia frontotemporal en la primera etapa.

Segunda Etapa

Hay un leve deterioro mental marcado por el olvido. El olvido es uno de los síntomas de la demencia frontotemporal temprana.

Tercera Etapa

La falta de memoria aumenta con la progresión de la demencia frontotemporal y se acompaña de problemas de concentración y la disminución de rendimiento en el trabajo.

Cuarta Etapa

La dificultad de concentración aumenta en los pacientes y también pueden empezar a olvidarse de los acontecimientos recientes. Comienza en esta etapa el aislamiento social.

Quinta Etapa

La persona sufre de casos drásticos de pérdida de memoria y la necesidad de contar con la asistencia en la realización de las actividades diarias. También comienzan a perder la sensación de la hora del día.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

El profesional de la salud que está tratando al paciente será el que determine la estrategia terapéutica a seguir.

Sexta Etapa

El individuo no puede reconocer a sus seres queridos y sufre de trastornos del habla. La capacidad para la comprensión disminuye al igual que el control de las funciones fisiológicas. También se presentan delirios, agitación, ansiedad y alucinaciones.

Séptima Etapa

En la etapa final se pierden por completo la capacidad de moverse, comunicarse o realizar actividades por sí mismos.

Tratamiento

No hay tratamiento absoluto de la demencia frontotemporal. El tratamiento de la demencia frontotemporal se centra principalmente en la reducción de los síntomas tales como alteraciones de comportamiento y cambios de humor mediante fármacos antidepresivos y antipsicóticos.