

TUMORES DE VIAS RESPIRATORIAS

La tráquea, la garganta (faringe), y la laringe pueden desarrollar tumores que, o bien crecen hacia el interior de tales estructuras, o bien ejercen presión sobre ellas, bloqueando así la respiración. Los tumores de otras partes del cuerpo también pueden extenderse a estas áreas (metástasis).

Es poco frecuente que se desarrollen tumores en la tráquea; suelen ser cancerosos (malignos) y descubrirse en un estadio localmente avanzado (habiéndose extendido a los tejidos circundantes o a los ganglios linfáticos).

Los tipos más frecuentes de tumores malignos de la tráquea incluyen el carcinoma de células escamosas, el carcinoma adenoquístico (carcinoma quístico adenoide), los tumores carcinoides y los carcinomas mucoepidermoides.

El tumor no canceroso (benigno) más frecuente en las vías respiratorias es un papiloma escamoso, aunque también pueden aparecer otros trastornos benignos.

Síntomas

Los síntomas de los tumores de las vías aéreas incluyen

- Dificultad respiratoria (disnea)
- Tos
- Tos con sangre (hemoptisis)
- Sibilancias u otros ruidos respiratorios anómalos

También pueden aparecer dificultad para tragar y afonía.

Tratamiento

- Cirugía
- Radioterapia
- Técnicas de reducción de la obstrucción

Algunos tipos de tumores de las vías aéreas deben extirparse quirúrgicamente si es posible. En otros casos, se recomienda la radioterapia, con o sin quimioterapia, o terapias dirigidas.

Si la cirugía no es posible, pueden utilizarse ciertos procedimientos menos invasivos para eliminar parte del tumor. La vaporización con láser, la terapia fotodinámica, la crioterapia y la braquiterapia endobronquial son opciones para eliminar un tumor que esté bloqueando una vía aérea. Si un tumor ejerce presión sobre la tráquea, los médicos pueden insertar una prótesis para mantener la tráquea abierta o usar radioterapia para reducir el tumor.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

El profesional de la salud que está tratando al paciente será el que determine la estrategia terapéutica a seguir.

Tratamiento natural

Hongos medicinales

Maitake, extracto puro (Hawlik): Durante el tratamiento de quimioterapia, tomar 2 cápsulas 3 veces al día, excepto el día concreto de tratamiento.

Melena de León, extracto puro (Hawlik) y Champiñón del Sol, extracto puro (Hawlik): Una vez terminada la quimioterapia, 2 cápsulas 2 veces al día de cada hongo. La melena de león protege al esófago del crecimiento invasivo del cáncer traqueal.

Salvestrol Platinum (Salvestrol)*: Se recomienda una dosis inicial de 6 cápsulas de Salvestrol Platinum durante 6 semanas. La mejor forma de tomarlas sería 4 cápsulas con el desayuno y 2 cápsulas 3-4 horas después (preferiblemente antes de las 15h). Posteriormente, se recomienda bajar la dosis a 1 cápsula diaria. La duración de tratamiento lo determinará su terapeuta en función de su respuesta.

(*) En el caso de que estuviese bajo tratamiento de quimio: En cuanto a suplementar con salvestroles y/o antioxidantes, solemos recomendar su discontinuación unos 3 días antes de recibir quimio y durante 3 días después. En el caso de salvestroles, su empleo en combinación con quimio causaría una apoptosis mayor. Por otro lado, la quimio genera mucha oxidación, y los antioxidantes restarían estos efectos si se empleasen a la vez.

INFORMACIÓN RESERVADA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

El profesional de la salud que está tratando al paciente será el que determine la estrategia terapéutica a seguir.